

Додаток 4: Особливості застосування ЛЗ при недостатності функції внутрішніх органів (печінки, нирок, легень, серця)

Міжнародна непатентована назва ЛЗ	Порушення функції печінки	Порушення функції нирок	Порушення функції серцево-судинної системи	Порушення функції дихальної системи
Абакавір	Протипоказаний при помірній, тяжкій недостатності, обережно - при підвищеному ризику захворювання. Рекомендованою дозою для пацієнтів з легким ступенем печінкової недостатності (індекс Child-Pugh 5-6) є 200 мг 2 р/добу у формі перорального застосування.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Агомелатин	Протипоказаний	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Адапален	Системна дія його не виражена.	Системна дія його не виражена.	Системна дія його не виражена.	Системна дія його не виражена.
Адеметіонін	Лікування рекомендується розпочинати з найменшої рекомендованої дози, з обережністю.	Лікування рекомендується розпочинати з найменшої рекомендованої дози, з обережністю.	Лікування рекомендується розпочинати з найменшої рекомендованої дози	спеціальних рекомендацій немає.
Азапентацен	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Азатіоприн	При недостатності - аналізи крові та печінкові функціональні тести. При появі гематологічної або печінкової токсичності - зменшити дозу.	Контролювати гематологічну відповідь. При появі гематологічної токсичності - зменшити дозу.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Азеластин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Клінічно значущий вплив на QT інтервал відсутній.	Спеціальних рекомендацій немає
Азитроміцин	Застосовувати з обережністю	Для пацієнтів з нирковою недостатністю легкого і помірною ступеня (швидкість клубочкової фільтрації 10-80 мл/хв) корекція дози препарату не потрібна. З обережністю застосовувати пацієнтам з тяжкою нирковою недостатністю	З обережністю при серцевих аритміях.	Спеціальних рекомендацій немає
Азо тузакис	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при вираженій гіпоксії та порушенні дифузії газів.
Акарбоза	Спеціальних рекомендацій немає	Не застосовувати при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Акривастин	Спеціальних рекомендацій немає	Не застосовувати при вираженій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Актовегін	спеціальних рекомендацій немає.	Протипоказаний при олігурії.	Протипоказаний при декомпенсованій СН.	Протипоказаний при набряку легень.

Албендазол	Контролювати активність печінкових ферментів до початку кожного циклу лікування.	Застосовувати з обережністю.	3	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Алем туз умаб	Не проводилося жодних досліджень щодо вивчення безпеки та ефективності	Дані відсутні		Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Алер гени інсектні	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає		Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Алер гени побутові	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає		Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Аліскірен	Коригування початкової дози не потрібно	Обережність при застосуванні	при	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Алкуроній	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при тяжкій недостатності.		Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Алое	Протипоказаний	Протипоказаний при нефрозо-нефриті, гломерулонефриті.	при	Протипоказаний при тяжких СС захворюваннях, АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Алопуринол	Ризик розвитку васкуліту із залученням печінки.	Ризик розвитку васкуліту із залученням нирок; необхідний ретельний контроль.		Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Алпростадил	Спеціальних рекомендацій немає	Нагляд при периферичних набряках чи нирковій дисфункції (рівень креатиніну в сироватці > 1,5 мг/дл).		Перевірка параметрів ССС (АТ та ЧСС).	Спеціальних рекомендацій немає
Алтея лікарська	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.		Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Альпразолам	Призначати мінімальні дози. Протипоказаний при тяжкій печінковій недостатності.	Призначати мінімальні дози		Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при тяжкій ДН, с-му апное під час сну.
Альтеплаза	протипоказаний при печінковій недостатності	з обережністю		протипоказаний при тяжкій формі неконтрольованої артеріальної гіпертензії; у пацієнтів з інсультом легкого ступеня ризик переважає над користю, тому їм не слід проводити терапію альтеплазою; хворі на інсульт дуже тяжкого ступеня мають підвищений ризик внутрішньочерепного крововиливу і смерті, тому їм не слід проводити терапію; хворі на обширний інфаркт мають більший ризик незадовільних наслідків, включаючи тяжкі крововиливи і смерть.	спеціальних рекомендацій немає
Альфакальцидол	Протипоказаний.	Спеціальних рекомендацій немає		Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Альф узозин	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при ортостатичній гіпотензії.	Спеціальних рекомендацій немає
Алюмінію фосфат	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при ХНН важкого ступеня	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Амантадин	З обережністю при порушеннях функції.	З обережністю при порушеннях функції.	При СН - посилення набряків.	Спеціальних рекомендацій немає
Амбазон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Амброксол	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при порушенні функцій нирок.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Аміак	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Амідо тризоат натрію	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при декомпенсованій СН.	Спеціальних рекомендацій немає
Амізон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Амікацин	Спеціальних рекомендацій немає	При лікуванні хворих з порушеною функцією нирок добову дозу потрібно знизити та/або збільшити інтервали між введеннями. Дозу знижують залежно від вмісту креатиніну в плазмі крові та маси тіла пацієнта.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Аміксин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Аміодарон	Регулярний аналіз функції печінки (трансамінази).	Спеціальних рекомендацій немає	Зміни на ЕКГ: подовження QT з можливим розвитком U-хвиль. Відмінити при появі АВ блокади I і II ступеня, СА блокади, блокади ніжок пучка Гіса.	Легенева токсичність - випадки диспное або непродуктивного кашлю.
Амісультрид	Зниження дози не потрібно	При нирковій недостатності з кліренсом креатиніну 30–60 мл/хв добову дозу необхідно знизити вдвічі, а при нирковій недостатності з кліренсом креатиніну 10–30 мл/хв – до третини	До застосування препарат у переконатись у відсутності факторів, які можуть сприяти розвитку порушення ритму: брадикардія менше 55 уд./хв, уроджений подовжений інтервал QT	Спеціальних рекомендацій немає
Амітриптилін	З обережністю при захворюваннях	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Аміфостин	Протипоказаний.	Контроль показників функцій нирок при ризику виникнення недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Амлодипін	. Дози препарату для застосування пацієнтам даної категорії не встановлені.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Амоксицилін	З обережністю призначати пацієнтам з дисфункцією	Коригувати дозу відповідно до ступеня порушення функції	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Ампіцилін	Протипоказаний.	Доз у препарату необхідно знизити; пацієнтам з вираженою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну <10 мл/хв.) препарат призначають у половинній дозі з інтервалом 12 годин.	Спеціальних рекомендацій немає	При БА - при одночасному застосуванні десенсибілізуючих засобів.
Амфотерицин В	Протипоказаний при тяжкій патології.	Протипоказаний при тяжкій патології.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Анагрелід	При легких і середніх ступенях функціональних порушень – контроль функції. Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Вазодилатація, тахікардія, відчуття серцебиття, застійна СН у хворих на ССЗ.	Спеціальних рекомендацій немає
Анастразол	Протипоказаний при недостатності.	Корекція дози не потрібна при легких і помірних порушеннях функції. Протипоказаний з тяжкою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну < 20 мл/хв);	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Антраць	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при порушенні видільної функції нирок.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Апілак	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Апрепітант	Добре переноситься пацієнтами з м'якою і помірною печінковою недостатністю; клінічні і фармакокінетичні дані щодо пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю (>9 балів за шкалою Child-Pugh) відсутні.	Немає необхідності змінювати режим дозування препарату для пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю та пацієнтів з нирковим захворюванням останньої стадії (ESRD), які перебувають на гемодіалізі.		
Апротинін	Спеціальних рекомендацій немає	При зниженій функції нирок зважити ризик/користь	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Арбідол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Аргінін глутамат	Показано	Відносним протипоказанням є тяжке порушення фільтраційної функції нирок	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Аргінін у гідрохлорид	спеціальних рекомендацій немає	при нирковій недостатності перед початком інфузії необхідно перевірити діурез та рівень калію в плазмі крові, оскільки препарат може сприяти розвитку гіперкаліємії	показаний	показаний

Аріпінразол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю - у пацієнтів із ССЗ (з ІХС або перенесеним ІМ, із СН і порушеннями провідності), цереброваскулярними захворюваннями і станами, що призводять до гіпотензії (зневоднення, гіповолемії і прийом гіпотензивних препаратів)	Спеціальних рекомендацій немає
Аспарагін аза	Може підсилювати токсичність інших препаратів ч/з вплив на функцію печінки.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Атазанавір	З обережністю при ХГВ або ХГС, захворюваннями печінки.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Атенолол	Зменшити дозу.	З обережністю при виражених порушеннях.	З обережністю при ІХС з АГ при різкому припиненні.	Спеціальних рекомендацій немає
Аторвастатин	Зменшити дозу або припинити лікування при трікратному зростанні активності АлАТ або АсАТ.	Випадки рабдоміолізу, в результаті - вторинна ниркова недостатність	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Атосибан	Досвід застосування у пацієнтів з порушенням функції відсутній	Досвід застосування у пацієнтів з порушенням функції відсутній	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Атракуріум	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	При незвичній чутливості до падіння АТ - вводити не менше 60 сек.	Спеціальних рекомендацій немає
Атропін	З обережністю.	З обережністю.	З обережністю при аритмії, АГ, застійній СН, ІХС, мітральному стенозі.	При захворюваннях легень протипоказаний
Ауротіомалат натрію	Протипоказаний при тяжких ураженнях.	Протипоказаний.	Припинення лікування при порушенні ЕКГ.	Припинення лікування при альвеоліті, бронхіоліті.
Афобазол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ацеклофенак	При тяжких порушеннях печінки потрібно контролювати функцію печінки і лікування потрібно починати з одноразової добової дози 150 мг. Застосування препарату у пацієнтів з гепатичною порфірією може спровокувати напад	Застосовувати найменшу ефективну дозу та постійно контролювати функцію нирок	Важливість певного рівня простагландинів у підтриманні ниркового кровотоку потрібно враховувати у пацієнтів з зниженою серцевою функцією	Призначати з обережністю пацієнтам, які страждають на БА
Аценокумарол	Протипоказаний.	Протипоказаний.	Протипоказаний при інфекційному ендокардиті серцевого клапана, перикардиті.	Відповідно до показань

Ацетазоламід	Протипоказаний (ризик енцефалопатії).	Протипоказаний при порушеннях, недостатності надниркових залоз. З обережністю при набряках ниркового генезу.	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при легеневій емболії та емфіземі.
Ацетил амінінтропропоксибензен	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ацетил саліцилат лізин у	Протипоказаний при тяжкій печінковій недостатності	Протипоказаний при тяжкій нирковій недостатності	Протипоказаний при тяжкій серцевій недостатності	Протипоказаний при бронхіальній астмі в анамнезі, спричиненій застосуванням саліцилатів або речовин подібної дії (особливо нестероїдних протизапальних засобів)
Ацетилцистеїн	Протипоказаний при захворюваннях печінки.	Протипоказаний при захворюваннях нирок.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при кровохарканні, легеневій кровотечі, БА
Ацикловір	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю. Необхідно підтримувати адекватний рівень гідратації організму.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Базіліксимаб	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Баклофен	З обережністю.	Зменшити дозу при підвищеному тонусі сфінктера сечового міхура.	З обережністю при антигіпертензивному лікуванні.	З обережністю при дихальній недостатності.
Бевацизумаб	Протипоказаний	Протипоказаний	Застосовувати з обережністю	Спеціальних рекомендацій немає
Беклометазон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при активному/латентному туберкульозі, можливій легеневій інфільтрації з еозинофілією.
Беміпарин	Слід бути обережними, призначаючи препарат хворим з печінковою недостатністю. Недостатня кількість даних не дозволяє надати рекомендації щодо корекції дозування беміпарину для даної категорії пацієнтів	Слід бути обережними, призначаючи препарат хворим з нирковою недостатністю, сечокам'яною хворобою. Недостатня кількість даних не дозволяє надати рекомендації щодо корекції дозування беміпарину для даної категорії пацієнтів	Слід бути обережними, призначаючи препарат хворим з неконтрольованою АГ.	Спеціальних рекомендацій немає.
Бендазол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Тяжка СН, артеріальна гіпотензія - протипоказаний	Спеціальних рекомендацій немає

Бендам устин	У пацієнтів з 30 % - 70 % пухлинного або метастатичного ураження печінки і нормальною або незначно зниженою функцією печінки, корекція дози не потрібна. Зниження дози на 50 % у пацієнтів з 30 % - 70 % пухлинного або метастатичного ураження печінки і помітно вираженою печінковою недостатністю.	Корекція дози не потрібна.		
Бензалконію хлорид	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Бензатин феноксиметилпеніцилін	Змінювати дозу не потрібно, однак доза повинна встановлюватись індивідуально	Змінювати дозу не потрібно, однак доза повинна встановлюватись індивідуально	Спеціальних рекомендацій немає	Слід з обережністю застосовувати препарат хворим на астму
Бензатин у бензилпеніцилін	Слід з обережністю призначати препарат при печінковій недостатності.		У хворих на сифіліс у стадії, що проявляється ураженням серцево-судинної системи, кровеносних судин реакції Яриша-Геркстеймера можна запобігти шляхом застосування преднізолону по 50 мг на добу або еквівалентного стероїду протягом 1-2 тижнів.	
Бензидамін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Бензилбензоат	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Бензилпеніцилін	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю застосовують при недостатності функції. При тяжких розладах функції нирок великі дози пеніциліну можуть викликати церебральні порушення, судоми, кому.	Спеціальних рекомендацій немає. Слід дотримуватись обережності при застосуванні пацієнтам з тяжкою кардіопатією, гіповолемією, епілепсією.	Протипоказано при БА
Бензобарбітал	Протипоказаний при тяжких паренхіматозних ураженнях	Протипоказаний.	Протипоказаний при декомпенсації СН.	Спеціальних рекомендацій немає
Бензоїл пероксид	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Берактан т	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Бета-аланін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Бетагістин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Контролювати стан хворих на БА

Бетаксол	На початку терапії - клінічне спостереження.	Корекція дози залежно від концентрації креатиніну в крові або кліренсу креатиніну, (кліренс креатиніну < 20 мл/хв) рекомендована початкова доза становить 10 мг на добу (незалежно від частоти та розкладу процедур діалізу у хворих, яким проводиться гемодіаліз).	Зменшити дозу при ЧСС нижче 50–55 ударів за хв., клінічних проявах брадикардії. З обережністю при AV блокаді, СН.	З обережністю при вираженому обмеженні функції легень, БА.
Бетаметазон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Бікалутамід	З обережністю при захворюваннях середнього і тяжкого ступеня тяжкості.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Біпериден	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при гіперплазії передміхурової залози.	З обережністю при порушеннях ритму серця.	Спеціальних рекомендацій немає
Бісакодил	Застосовувати з обережністю	Застосовувати з обережністю	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Біспролол	Пацієнтам з тяжкою формою печінкової недостатності доза не повинна перевищувати добову дозу 10 мг .	Пацієнтам з тяжкою формою ниркової недостатності (кліренс креатиніну менше 20 мл/хв) доза не повинна перевищувати добову дозу 10 мг .	З обережністю при хр. СН, AV блокадою I ступеня.	При ХОЗЛ - мінімальні дози у комбінації з бронходилататорами.
Біфідумбактерин	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Біфідорм	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Біфоназол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Блеоміцин	застосовувати з обережністю	При нирковій недостатності дозу необхідно коригувати залежно від серологічної концентрації серотоніну	З обережністю при ІХС, вадах серця.	Не рекомендується при тяжких порушеннях дифузном фіброзі легеневої тканини, виражених патологічних змінах у легенях.
Бортезоміб		З обережністю при легких і середніх порушеннях функції. При множинній мієломі – догляд, корекція дози.		
Бортезоміб		З обережністю при легких і середніх порушеннях функції. При множинній мієломі – догляд, корекція дози.		
Бортезоміб		З обережністю при легких і середніх порушеннях функції. При множинній мієломі – догляд, корекція дози.		
Бринзоламід	З особливою обережністю при наявності захворювань печінки.	Протипоказаний при гострій недостатності, гіперхлоремічному у ацидозі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Бромгексин	З обережністю при тяжких захворюваннях.	З обережністю при обмеженій функції, тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при порушенні бронхіальної моторики і значній кількості секрету.

Бромокриптин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	ІХС, АГ, інші серйозні СС захворювання - протипоказаний	При тривалому прийомі при хворобі Паркінсона - можливий плевральний випіт, легеневий і плевральний фіброз.
Будесонід	Протипоказаний при цирозі та ознаках портальної гіпертензії.	Спеціальних рекомендацій немає.	Гіпертензія, підвищений ризик тромбозів, васкуліт після відміни.	Спеціальних рекомендацій немає.
Бупівакаїн	З обережністю при прогресуючих хворобах	З обережністю при гострій недостатності.	З обережністю при СН, за наявності у пацієнтів АВ блокади II або III ст	Спеціальних рекомендацій немає
Бупренорфін	Протипоказаний при гострій недостатності.	З обережністю при недостатності, гіпертрофії простати і стенозі уретри	З обережністю при артеріальній гіпотензії	Протипоказаний при гострій дихальній недостатності, з обережністю при БА, ДН
Бупропіон у гідрохлорид	Пацієнтам з легким та помірним ступенем цирозу печінки необхідно робити більші інтервали між дозами. Застосовують з обережністю.	Лікування розпочинати зменшеними дозами та або з меншою частотою	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Бусерелін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	У пацієнтів з гіпертензією слід регулярно контролювати рівень АТ (ризик втрати контролю рівнів АТ).	Спеціальних рекомендацій немає
Бупірон	Протипоказаний при тяжкій дисфункції.	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Бусульфан	З обережністю.	З обережністю.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Бутамірат	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Уникати одночасного застосування з віджаркувальними засобами.
Бутилскополамін	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при можливій обструкції сечовивідних шляхів.	З обережністю при схильності до тахіаритмії.	Спеціальних рекомендацій немає
Бутокназол	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Буторфанол	Протипоказаний при тяжких порушеннях	Протипоказаний при тяжких порушеннях	З обережністю при гіпертонічній хворобі	З обережністю при пригніченні дихання різного генезу.
Вазелін	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Вакцина для профілактики захворювань, що викликаються папіломовірусною інфекцією (тип 16, 18)	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Вакцина для профілактики захворювань, що викликаються папіломовірусною інфекцією (тип 6, 11, 16, 18)	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Валацикловір	З обережністю високі дози.	Зменшення дози.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Валсартан	З обережністю при обструктивних порушеннях жовчовивідних шляхів.	З обережністю при порушеннях функції.	З обережністю при СН, аортальному і мітральному стенозі, обструктивній гіпертрофічній кардіоміопатії.	Спеціальних рекомендацій немає
Вальдекоксиб	З обережністю при помірній недостатності.	З обережністю.	З обережністю після аортокоронарного шунтування, при АГ, СН.	Спеціальних рекомендацій немає
Ванкоміцин	Спеціальних рекомендацій немає.	Слід відкорегувати дозування відповідно до кліренсу креатиніну.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає
Варденафіл	Не рекомендується при тяжких порушеннях.	Не рекомендується при захворюваннях нирок у термінальній ст.	Не рекомендується при вираженій гіпотонії, нестабільній стенокардії, після геморагічного інсульту або ІМ. Протипоказаний при прийомі антиаритмічних препаратів типу ІА або типу ІІІ.	Спеціальних рекомендацій немає
Варфарин	Протипоказаний при тяжких захворюваннях.	Протипоказаний при тяжких захворюваннях.	Протипоказаний при тяжкій вираженій АГ, геморагічному інсульті, аневризмі аорти, бактеріальному ендокардиті, внутрішньочерепному кроволиві.	Спеціальних рекомендацій немає
Векуронію бромід	З обережністю при захворюваннях печінки та жовчного тракту.	З обережністю внаслідок збільшення тривалості періоду дії.	З обережністю при ССЗ, набряковому с-мі.	Спеціальних рекомендацій немає
Венлафаксин	Зменшити дозу при помірній недостатності, не рекомендується при тяжкій недостатності. Протипоказаний при тяжких захворюваннях.	Зменшити дозу при помірній недостатності, гемодіалізі. Протипоказаний при тяжких захворюваннях.	Протипоказаний при захворюваннях серця, порушенні електролітного балансу, АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Верапаміл	Мінімальні дози при значних порушеннях.	З обережністю при недостатності функції.	З обережністю при СН. Не можна призначати хворим з ІМ протягом 7 днів після події.	Спеціальних рекомендацій немає
Вінбластин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Вінкамін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю застосовувати при АГ та порушеннях функції серця; не застосовувати при подовженні інтервалу QT та гіпокаліємії	Спеціальних рекомендацій немає
Вінкристин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Вінорельбін	зменшити дозу	дозу коригувати немає необхідності через незначний ступінь виведення препарату нирками	застосовувати з обережністю	Спеціальних рекомендацій немає

Вінпоцетин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при підвищеному внутрішньочерепному тиску, застосуванні протиаритмічних засобів, порушенні ритму серця, подовженні інтервалу QT. Контроль ЕКГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Віснуту субцитрат	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при виражених порушеннях	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Вода для ін'єкцій	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Вориконазол	Періодично визначати показники функції та рівень білірубіну.	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при застосуванні хіміотерапевтичних препаратів з кардіотоксичною дією, кардіоміопатією, гіпокаліємією, препаратів, що здатні спричинити гіпокаліємію.	Спеціальних рекомендацій немає
Вугілля медичне активоване	Даних в інструкції немає	Даних в інструкції немає	Даних в інструкції немає	Даних в інструкції немає
Габапентин	Спеціальних рекомендацій немає	Підбір дози при порушеннях функції, пацієнтам, які знаходяться на гемодіалізі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Галантамін	З обережністю при помірних та виражених порушеннях, не рекомендується при тяжких порушеннях.	Не рекомендується при тяжких порушеннях, обструкції сечових шляхів, пацієнтам, які недавно перенесли операцію сечового міхура.	З обережністю при СССВ, інших суправентрикулярних порушеннях провідності, застосуванні препаратів, що знижують ЧСС.	З обережністю при тяжкій формі БА, обструктивних хворобах легень.
Галоперидол	З обережністю при патології, при тривалому застосуванні - періодичний контроль картини крові і функції печінки. Протипоказаний при тяжкому ступеню недостатності.	Протипоказаний при тяжкому ступеню недостатності.	З обережністю при с-мі подовженого інтервалу QT, гіпокаліємії, одночасному прийомі препаратів, що подовжують інтервал QT.	Спеціальних рекомендацій немає
Ганірелікс	Протипоказаний при помірному або значному порушенні функції.	Протипоказаний при помірному або значному порушенні функції.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Ганцикловір	Спеціальних рекомендацій немає	Хворим із нирковою недостатністю дози необхідно коригувати.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гатифлоксацин	Немає необхідності проводити корекцію режиму дозування для пацієнтів з порушеннями функції печінки.	З обережністю при нирковій недостатності. Корекція дози.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гексаметоній	Протипоказаний при недостатності, захворюваннях жовчного міхура в анамнезі, жовтусі.	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при АГ, ІМ в г. стадії, ішемічному інсульті (до 2 міс.), тромбозі (у т. ч. мозкових артерій).	Спеціальних рекомендацій немає

Гексестрол	Протипоказаний при захворюванні печінки. З обережністю препарат застосовують пацієнтам із захворюваннями жовчного міхура (особливо холелітазом), жовтяницею під час попередньої вагітності в анамнезі, печінковою порфірією.	Протипоказаний при захворюванні нирок.	особлива обережність необхідна при застосуванні препарату пацієнтам із захворюваннями коронарних та церебральних судин, активним тромбофлебітом і тромбоемболічними захворюваннями, оскільки високі дози естрогенів підвищують ризик розвитку інфаркту міокарда, тромбоемболії легених судин та тромбофлебіту.	Спеціальних рекомендацій немає
Гексетидин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	При БА інгаляція може викликати бронхоконстрикцію.
Гексопреналін	Протипоказаний при важких захворюваннях.	Протипоказаний при важких захворюваннях.	Протипоказаний при ССЗ, порушенні серцевого ритму, міокардиті, пороці мітрального клапану, аортальному стенозі, ІХС, АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Геміфлоксацін	Корекція дози не потрібна	Корекція дози не потрібна з легкою та помірною формами ниркової недостатності (кліренс креатиніну більше 40 мл/хв). При тяжких формах ниркової недостатності (кліренс креатиніну менше 40 мл/хв).	Подовження QT-інтервалу на ЕКГ, у тому числі природжене - протипоказаний	Спеціальних рекомендацій немає
Гемцитабін	призначають з обережністю	призначають з обережністю	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гентаміцин	Спеціальних рекомендацій немає	При тривалому лікуванні - контроль функції.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гепарин	Протипоказаний при тяжких захворюваннях.	Протипоказаний при значній патології нирок або нирковій кровотечі.	Протипоказаний при АГ; бактеріальному ендокардиті.	Спеціальних рекомендацій немає
Гепариноід	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Гепон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гепітиніб	Контроль функції. При високій активності трансаміназ застосування припинити.	пацієнтам із кліренсом креатиніну <20 мл/хв слід застосовувати препарат слід з обережністю та регулярно контролювати функцію нирок	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при ідіопатичному фіброзі легень, інтерстиціальній пневмонії, пневмоконозі, постпроменевої пневмонії, лікарському пневмонії.
Гіалуронідаза	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гідазепам	З обережністю при недостатності, алкогольному ураженні.	З обережністю при ХНН.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Гідрогель метилкремнівої кислоти	Для дезінтоксикації при токсичному гепатиті, ВГА і ВГВ, гепатохолециститі, цирозі печінки, холестази різної етіології.	Для дезінтоксикації при ХНН, спричиненій пієлонефритом, полікістозом, нефролітіазом, нирок.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гідрокортизон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гідроксиетилкрахмаль 200 000/0,5	З обережністю	З обережністю	З обережністю при компенсованій СН	Спеціальних рекомендацій немає.
Гідроксиетилкрахмаль 450000/0,7	З обережністю	З обережністю	З обережністю при набряку легень та декомпенсованій СН.	Спеціальних рекомендацій немає.
Гідроксизин	Зменшити дозу при дисфункції.	Зменшити дозу при помірно вираженій чи тяжкій недостатності, з обережністю при гіпертрофії простати, утрудненому сечевиділенні.	З обережністю при схильності до серцевої аритмії, застосуванні протиаритмічних препаратів.	Спеціальних рекомендацій немає
Гідроксикарбамід	З обережністю при недостатності.	З обережністю при недостатності	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гідроксипрогестерон	З обережністю.	З обережністю.	З обережністю при ССЗ.	З обережністю при БА.
Гідроксихлорохін	З обережністю.	Контроль функції при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гідролізований лігнін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гідроморфон	лікування хворих з печінковою недостатністю середньої тяжкості слід починати при низькій дозі і під наглядом лікаря	лікування хворих з нирковою недостатністю слід починати при низькій дозі і під наглядом лікаря; при тяжкій нирковій недостатності розглянути можливість збільшення інтервалу між дозами	може спричинити значне зниження АТ у хворих з лабільністю артеріального тиску	слід з обережністю застосовувати у хворих зі значно зниженим резервом дихання або вже наявним пригніченням дихання, а також у хворих із ХОЗЛ
Гідротальцит	Спеціальних рекомендацій немає	Не рекомендується при порушенні видільної функції.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гідрохлортиазид	Протипоказаний при недостатності	Контроль електролітного балансу та кліренсу креатиніну при недостатності	Спеціальних рекомендацій немає	Обережності дотримуватися у хворих із СН, в хворих, які лікуються глікозидами наперстянки
Гідрохлортиазид	Спеціальних рекомендацій немає.	необхідно контролювати електролітний баланс і кліренс креатиніну. Протипоказаний при виражених порушеннях функції нирок (кліренс креатиніну <30 мл/хв).	слід регулярно контролювати концентрацію калію у плазмі.	Спеціальних рекомендацій немає.
Гінкго білоба	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гіпромелоза	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Глатирамер ацетат	Спеціальних рекомендацій немає	Контроль лабораторних показників при порушенні функції.	З обережністю при патології серця.	Спеціальних рекомендацій немає
Глауцин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при гіпотензії та лабільному АТ.	Не застосовувати при продуктивному кашлі, з виділенням мокротиння.

Глібенкламід	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гліквідон	Спеціальних рекомендацій немає	Контроль при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гліклазид	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Глікозиди сени	протипоказаний при органічних ураженнях печінки.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Глімепірид	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності, хворим, які перебувають на діалізі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гліпізид	Протипоказаний.	Протипоказаний.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гліцерин	Даних в інструкції немає.	Даних в інструкції немає.	Даних в інструкції немає.	Даних в інструкції немає.
Гліцин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Зменшення дози, контроль АТ при схильності до гіпотензії.	Спеціальних рекомендацій немає
Глюкоза 10 %	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Глюкоза 5 %	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Глюкозамін	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при недостатності функції у стадії декомпенсації.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гозерелін	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при захворюваннях нирок (нирковій недостатності).	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Гризеоф ульвін	при органічних ураженнях протипоказаний	при органічних ураженнях протипоказаний	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає
Гуанф ацин	корекція дози не потрібна.	корекція дози не потрібна.	Застосування повинно ґрунтуватися на ретельній оцінці співвідношення ризик/користь і здійснюватися під пильним медичним контролем у таких випадках при атріовентрикулярній блокаді II або III ступенів (блокада може прогресувати до більш високого ступеня); при синусовій брадикардії (симптоматична брадикардія може розвиватися); при тяжкій коронарній недостатності; нещодавно перенесеному інфаркті міокарда в анамнезі, недостатності мозкового кровообігу, нещодавно перенесений інсульт в анамнезі.	Спеціальних рекомендацій немає.
Дакарбазин	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Дакліз умаб	Спеціальних рекомендацій немає	Корекція дози не потрібна.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Дактиноміцин	Протипоказаний	Застосовують з обережністю	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Даларгін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при вираженій гіпотензії, схильності до гіпотонії.	Спеціальних рекомендацій немає
Далтепарин	З обережністю при тяжкій недостатності.	З обережністю при тяжкій недостатності.	З обережністю при неконтрольованій АГ, гіпертонічній ретинопатії.	Спеціальних рекомендацій немає
Даназол	Протипоказаний при виражених порушеннях функції.	Протипоказаний при виражених порушеннях функції, порфірії.	Протипоказаний при виражених порушеннях функції серця.	Спеціальних рекомендацій немає
Даптоміцин	При недостатності середнього ступеня не потребується коригування дози, немає даних для пацієнтів з тяжкою недостатністю	Пацієнтам з кліренсом креатиніну > 30 мл/хв не потрібна коригування дози препарату. Інтервали між окремими дозами мають бути збільшені до 48 годин у пацієнтів з кліренсом креатиніну < 30 мл/хв. Пацієнтам літнього віку з тяжкою нирковою недостатністю застосовувати не рекомендується.	Спеціальні рекомендації відсутні	Спеціальні рекомендації відсутні
Дарбепоетин альфа	З обережністю застосовувати у пацієнтів з захворюванням печінки. Всім пацієнтам з показниками феритину сироватки нижче 100 мкг/л або тим, у кого насичення трансферину є нижчим за 20%, рекомендується допоміжна терапія залізом.	Якщо підвищення гемоглобіну становить більше 20 г/л (1,25 ммоль/л) за чотири тижні, дозу зменшують приблизно на 25% залежно від швидкості підвищення.	У пацієнтів з ХНН та клінічними ознаками ІХС або застійної СН цільові концентрації гемоглобіну слід визначати індивідуально.	Спеціальних рекомендацій немає
Дарун авір	з обережністю. При тяжкій формі - протипоказаний.	Пацієнтам із порушеннями функції нирок змінювати дозу не потрібно.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Даунорубіцин	Необхідна корекція дози. Протипоказано при тяжких порушеннях	Необхідна корекція дози. Протипоказано при тяжких порушеннях	Протипоказано при органічних ураженнях серця, хронічна серцева недостатність	Спеціальних рекомендацій немає
Декамтоксин	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Показаний згідно інструкції застосування
Декваліній	Особливих застережень немає.	Особливих застережень немає.	Особливих застережень немає.	Особливих застережень немає.
Дексаметазон	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при недостатності і одночасному лікуванні основного захворювання.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Дексаметазон	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при недостатності і одночасному лікуванні основного захворювання.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Дексепрофен	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при середній та тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій неконтрольованій СН.	Протипоказаний при БА в анамнезі.
Декстран	Спеціальних рекомендацій немає.	З обережністю при порушенні видільної функції, протипоказаний при захворюваннях нирок з анурією.	Протипоказаний при СН.	Спеціальних рекомендацій немає.
Декстран-40	Спеціальних рекомендацій немає.	Протипоказаний при важкій недостатності	Протипоказаний при некомпенсованій СН 2-3 стадії. З обережністю при АГ.	Спеціальних рекомендацій немає.
Декстрометорфан	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Протипоказаний при БА, емфіземі легень, ДН.
Демокситоцин	Особливих рекомендацій немає.	Особливих рекомендацій немає.	Особливої обережності слід дотримуватися, якщо є гіпертензія в наслідок вагітності. Слід бути особливо обережними при збудженні пологів у жінок із захворюваннями серцево-судинної системи.	Особливих рекомендацій немає.
Десмопресин	Під контролем при порушеннях функції.	Під контролем при порушеннях функції.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Децитабін	Необхідність корекції дози не встановлена	Необхідність корекції дози не встановлена	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Джозаміцин	Протипоказаний при виражених порушеннях функції.	Контроль лабораторних показників.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Дигоксин	Спеціальних рекомендацій немає.	Ретельний добір дози.	Ретельний добір дози при імплантованому електростимуляторі.	Спеціальних рекомендацій немає.
Диданозин	Зменшити дозу.	Підбір дози.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Дидрогестерон	З обережністю застосовувати в пацієнок з гострими захворюваннями печінки, а також за наявності захворювань печінки в минулому, якщо показники функції печінки не нормалізувалися. У разі виникнення тяжкої печінкової недостатності прийом препарат унеобхідно припинити.	Спеціальних рекомендацій немає.	Підвищений ризик розвитку венозної тромбоемболії. Можливість підвищеного ризику серцево-судинної захворюваності в перший рік лікування, підвищений ризик розвитку ішемічного гострого порушення мозкового кровообігу.	Спеціальних рекомендацій немає.
Диетиловий етер	Протипоказаний при тяжких захворюваннях.	Протипоказаний при тяжких захворюваннях.	Протипоказаний при АГ, ССЗ із вираженим підвищенням АТ і декомпенсацією СН.	Протипоказаний при туберкульозі легень, ГРЗ.
Диклофенак	З особливою обережністю	З особливою обережністю	З особливою обережністю	З особливою обережністю при БА, алергічному риніті, поліпах слизової оболонки носа.

Дилтіазем	З обережністю. Рекомендують розпочинати лікування з нижчої дози – 30 мг 3-4 рази на добу.	З обережністю	З обережністю при блокаді ніжок пучка Гіса, AV блокаді I ступеня	Спеціальних рекомендацій немає
Диметинден	Спеціальних рекомендацій немає	бути обережними при застосуванні	Спеціальних рекомендацій немає	бути обережними при застосуванні
Диметинден	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при затримці сечі, пов'язаній із захворюванням передміхурової залози і сечовивідних шляхів.	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при хр. захворюваннях
Динатрію фолінат	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Динопрост	З обережністю при жовтусі, гострих захворюваннях.	З обережністю при гострих захворюваннях.	З обережністю при захворюваннях серця з гострими симптомами; при гіпертензії або гіпотензії.	Протипоказаний при БА, гострих та ХОЗЛ.
Динопростон	З обережністю.	З обережністю.	З обережністю при кардіоваскулярних порушеннях	З обережністю при БА.
Дипіридамо́л	Зменшити дозу.	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при атеросклерозі коронарних артерій, г. ІМ, декомпенсованій СН, аритмії, артеріальній гіпотонії.	Протипоказаний при БА, обструктивних захворюваннях легень.
Дистигмін	Протипоказаний при гіпертонусі жовчних шляхів.	Протипоказаний при гіпертонусі сечових шляхів.	Протипоказаний при ваготонії, що супроводжується зниженням АТ, уповільненні серцевої діяльності, хр. СН, ІМ.	Протипоказаний при БА.
Дисульфірам	Протипоказаний при тяжкій недостатності, припинити при підвищенні трансаміназ в сироватці крові втрічі.	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при СС розладах.	Протипоказаний при тяжкій ДН.
Дифенгідрамін	З обережністю.	Протипоказаний при гіпертрофії передміхурової залози, стенозі шийки сечового міхура, з обережністю при порушенні функції.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при БА.
Дицикловерин	Протипоказано при печінковій недостатності.	Протипоказано при нирковій недостатності.	Особливих застережень немає.	Особливих застережень немає.
Діазепам	Протипоказаний при тяжкій печінковій недостатності.	Протипоказаний при виражених порушеннях	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при г. дихальній недостатності.
Діамантовий зелений	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Діацерейн	Контроль ферментів печінки кожні 4 місяці.	Контроль аналізу сечі кожні 4 місяці, при нирковій недостатності – зменшити дозу.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Діоксидин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Діосмектит	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Діосмін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Добутамін	Спеціальних рекомендацій немає	Не протипоказаний.	Протипоказаний при тампонаді серця, констриктивному перикардиті, гіпертрофічної обструктивної кардіоміопатії, ідіопатичному гіпертрофічному субаортальному стенозі, тяжкої форми аортального стенозу. Обережно при ішемії та ІМ.	Спеціальних рекомендацій немає
Доксазозин	З обережністю.	Не протипоказаний.	Контроль функцій СС системи (ЧСС, АТ, показники ЕКГ).	Спеціальних рекомендацій немає
Доксепін	Протипоказаний при тяжких порушеннях.	Протипоказаний при затримці сечі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Доксиламін	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при хворобах уретри та передміхурової залози	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Доксициклін	Слід з обережністю застосовувати у пацієнтів з печінковою недостатністю або в осіб, які отримують потенційно гепатотоксичні препарати.	Не протипоказаний.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Доксорубіцин	слід зменшити дозу.	Спеціальних рекомендацій немає	ЕКГ-контроль. З обережністю при хворобах серця, кардіотоксичний.	Спеціальних рекомендацій немає
Доксофлілін	З обережністю. При тяжкій печінковій недостатності потрібне зниження дози.	З обережністю при вираженій недостатності.	З обережністю при підвищеному АТ, кардіопатії, хр. легеновому у серці, хр. СН, хронічною правощуночковою недостатністю, застійною серцевою недостатністю.	Спеціальних рекомендацій немає.
Домперидон	З обережністю при недостатності.	При повторному введенні – зменшення частоти введення, дози при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Донепезил	Спеціальних рекомендацій немає	Можлива обструкція току сечі із сечового міхура.	З обережністю при СССВ, порушеннях надшлуночкової провідності.	З обережністю при БА, обструктивних захворюваннях легень.
Допамін	Контроль стану хворого.	Протипоказаний при аденомі передміхурової залози із затримкою сечі. Контроль функції.	Протипоказаний при тахіаритмії, фібриляція шлуночків, постійна корекція дози.	Спеціальних рекомендацій немає
Доріпенем	Не потрібно коригувати дозу	У пацієнтів з помірною нирковою недостатністю (кліренс креатиніну від ≥ 30 до ≤ 50 мл/хв) доза повинна становити 250 мг кожні 8 год. У пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну від > 10 до < 30 мл/хв) доза має становити 250 мг кожні 12 год.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Доцетаксел	Не рекомендований при перевищенні білірубіну та трансаміназ в 1,5 рази, лужної фосфатази - у 2,5 рази.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Дротаверин	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій СН, обережно при гіпотензії.	Спеціальних рекомендацій немає
Дулоксетин	Початкове дозування нижче при цирозі.	Зменшення дози при хр. та тяжкій недостатності	Моніторинг АТ при АГ, інших захворюваннях серця.	Спеціальних рекомендацій немає
Дугастерид	З обережністю. Протипоказаний при вираженій печінковій недостатності.	Корекції дози не потрібно.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Дьоготь кам'яновугільний	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Дьоготь кам'яновугільний	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Ебастин	З обережністю при печінковій недостатності	З обережністю при нирковій недостатності	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Еверолімус	Зменшити та титрувати дозу при недостатності.	Моніторинг функції, з обережністю при призначенні з іншими препаратами.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Езомепразол	Не перевищувати дозу при тяжких порушеннях	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Екземестан	застосовувати слід з обережністю	застосовувати слід з обережністю	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Еконазол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ексетатид	Пацієнти з печінковою недостатністю не потребують корекції дози	Пацієнти з легким ступенем ниркової недостатності не потребують корекції дози; з середнім ступенем ниркової недостатності - необхідне поступове підвищення дози; не рекомендований для застосування у пацієнтів з термінальною стадією захворювання нирок або тяжкою нирковою недостатністю	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Екстра Ербісол	Показаний	Показаний	При підвищеному АТ слід застосовувати з обережністю, зменшуючи дозу	Показаний
Екстракт артишоку	протипоказаний при тяжкій недостатності.	показаний.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Екстракт плаценти	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при тяжких захворюваннях	Протипоказаний при тяжких захворюваннях серцево-судинної системи	Спеціальних рекомендацій немає
Ектерицид	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Елеутерокок	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при АГ, порушенні серцевого ритму.	Спеціальних рекомендацій немає

Емоксипін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Під час лікування емоксипіном слід контролювати стан системи згортання крові та АТ.	Спеціальних рекомендацій немає
Еналаприл	Протипоказаний при захворюваннях печінки, недостатності.	Протипоказаний при стенозі ниркових артерій, стані після трансплантації нирки. Повинен бути збільшений інтервал між прийомами еналаприлу і/або зменшене дозування препарату.	Протипоказаний при стенозі артеріального, мітрального клапану з вираженими порушеннями гемодинаміки; гіпертрофічної кардіоміопатії	Спеціальних рекомендацій немає
Еноксапарин	Контроль при недостатності.	Перед початком лікування – оцінка функції нирок; ретельно контролювати стан хворих із нирковою недостатністю	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ентакапон	Протипоказаний при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ентекавір	При печінковій недостатності корекція дози не потрібна; безпека і ефективність у пацієнтів, які перенесли трансплантацію печінки, не відомі; контролювати функцію нирок під час лікування як у пацієнтів, які перенесли трансплантацію печінки, так і тих, хто одержує імунодепресанти	Рекомендується корекція дози для пацієнтів із кліренсом креатиніну < 50 мл/хв, зокрема для тих, які перебувають на гемодіалізі і тривалому амбулаторному перитонеальному діалізі	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ентроп	З обережністю призначати хворим з тяжкими органічними ураженнями печінки	Протипоказаний при нирковій недостатності	З обережністю призначати хворим з тяжким перебігом АГ, при атеросклерозі	Спеціальних рекомендацій немає
Епінефрин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при АГ, легеневій гіпертензії, вираженому атеросклерозі, стенокардії, тяжких ССЗ, аневризмі, тахіаритмії, фібриляції шлуночків або передсердь.	Спеціальних рекомендацій немає
Епірубіцин	Зменшити дозу.	Корекції дози не потрібно.	Протипоказаний при СН.	Спеціальних рекомендацій немає
Еплеренон	спеціальних рекомендацій немає.	Контроль рівня калію в сироватці. З обережністю при мікроальбумінурії, креатиніні в сироватці > 2,5 мг/дЛ, кліренсі креатиніну < 50 мл/хв.	Контроль рівня електролітів.	Спеціальних рекомендацій немає
Епоетин альфа	З обережністю при хр. недостатності.	З обережністю при ХНН.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Епоетин бета	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при ХНН	З особливою обережністю при СН, АГ, ІХС.	Спеціальних рекомендацій немає

Епросартан	Підбір дози не потрібен.	Якщо протягом терапії погіршуються функції, лікування переглянути.	З обережністю при СН, аортальному і мітральному стенозі, обструктивній гіпертрофічній кардіоміопатії.	Спеціальних рекомендацій немає
Ептифібатид	Спеціальних рекомендацій немає	Може застосовуватися в загальних дозах при легкій або помірній нирковій недостатності	Не рекомендовано застосовувати у хворих, яким за клінічними показаннями необхідно вводити тромболітики (при г. трансуральном у ІМ з новим патологічним зубцем Q, підвищенням сегменту ST чи блокадою лівої ніжки пучка Гіса на ЕКГ).	Спеціальних рекомендацій немає
Ептифібатид	Протипоказаний при клінічно виражених порушеннях	Протипоказаний при гострій та ХНН, діалізі.	Протипоказаний при вираженій АГ на фоні антигіпертензивної терапії.	Спеціальних рекомендацій немає
Ербісол	При холециститі поєднання з терапією, що нормалізує діяльність біліарної системи.	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при підвищеному АТ, у фазі загострення патологічного процесу.	Спеціальних рекомендацій немає
Ербісол Уль трафарм	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ергокальциферол	Протипоказаний.	Протипоказаний.	Протипоказаний при органічних ураженнях серця і судин.	Протипоказаний при активній формі туберкульозу легень.
Ергометрин	Протипоказаний при вираженій недостатності.	Протипоказаний при виражених порушеннях функцій.	Протипоказаний при АГ, стенозі мітрального клапана.	Спеціальних рекомендацій немає
Ердостейн	З обережністю при тяжкій недостатності.	З обережністю при тяжкій патології нирок.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при кровохарканні, з обережністю при БА.
Еритроміцин	З обережністю призначають при порушеннях функції	З обережністю призначають при порушеннях функції	Спеціальних рекомендацій немає	Необхідно проводити контроль за пацієнтами з БА.
Ерлотиніб	З обережністю.	Не рекомендується	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при інтерстиціальному, паренхіматозному, захворюванні легень, метастатичними ураженнями або інфекцією.
Ертапенем	корекція дози не потрібна.	у пацієнтів з кліренсом креатиніну >30 мл/хв./1,73 м ² корекція дози не потрібна; дорослі з тяжкою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну <30 мл/хв./1,73 м ²), включаючи тих, які знаходяться на гемодіалізі, повинні отримувати по 500 мг препарат у на добу.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Есмолол	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю.	З обережністю при серцевій блокаді І ступеня.	З обережністю при бронхоспастичних захворюваннях, утрудненому диханні, БА.

Естрадіол	Протипоказаний при пухлинах, тяжких захворюваннях. При погіршенні показників функції печінки застосування препарату варто припинити.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при артеріальній тромбоемболії в г. стадії.	З обережністю при БА.
Естрамустин	Контроль функціональних печінкових проб.	З обережністю при недостатності.	Протипоказаний при тяжких ССЗ, ІХС.	Спеціальних рекомендацій немає
Естріол	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Контроль при затримці рідини, з умовленої дисфункцією.	Не рекомендується для жінок із захворюваннями серця, АГ. Незначне зростання ризик у виникнення інсульту. Може збільшувати ризик утворення тромбів у венах (венозна тромбоемболія).	Спеціальних рекомендацій немає
Естрон	Протипоказаний при недостатності, з обережністю при захворюваннях жовчного міхура.	Протипоказаний при недостатності.	З обережністю при АГ, перенесених тромбоемболічних захворюваннях.	Спеціальних рекомендацій немає
Есци талограм	Зміна дози при зниженні функції.	З обережністю при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Етамбутол	Контроль функцій.	Протипоказаний при недостатності. Контроль функцій.	Спеціальних рекомендацій немає	На початку лікування можливе посилення кашлю, збільшення мокроти.
Етамзилат	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Етанол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	При лікуванні набряку легень протипоказання - психомоторне збудження і больовий с-м при ІМ	Спеціальних рекомендацій немає
Етацизин	Протипоказаний.	Протипоказаний.	Протипоказаний при АВ блокаді II - III ст., кардіогенному шоці, вираженій АГ, тяжкій СН. З обережністю при порушеннях серцевого ритму, СССВ, порушеннях провідності по волокнам Пуркіньє, ІМ, ускладнених порушеннях серцевого ритму.	Спеціальних рекомендацій немає
Етинілестрадіол	Протипоказаний при хр. захворюваннях, ускладнених гіпербілірубінемією, жовчочкам'яній хворобі, холециститі, холестази і жовт усі.	Протипоказаний при тяжких хворобах нирок	Протипоказаний при тяжких ССЗ, вираженій АГ, порушеннях ліпідного обміну, з обережністю при веносній тромбоемболії в анамнезі або наявності тромбофілітичних станів.	З обережністю при БА.
Етіонамід	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Етодолак	може відмічатися дозозалежне зниження утворення простагландинів і сприяти розвитку декомпенсації нирок, до пацієнтів із високим ризиком розвитку цих реакцій відносяться пацієнти з порушенням функції печінки	при прогресуючій нирковій недостатності не рекомендується; при порушенні функції нирок може відмічатися дозозалежне зниження утворення простагландинів і сприяти розвитку декомпенсації нирок	застосування для лікування болю у перші 10-14 днів при аортокоронарному шунтуванні підвищує ризик ІМ; може призводити до підвищення АТ чи погіршення стану при АГ, що сприятиме появі побічних реакцій з боку ССС; з обережністю застосовувати пацієнтам із СН	при БА не слід застосовувати препарат пацієнтам, в анамнезі яких при лікуванні іншими НПЗЗ були вказівки на виникнення астми, риніту
Етоній	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Етопозид	З обережністю при недостатності.	З обережністю при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Еф авіренз	Моніторинг печінкових ензимів при гепатиті В, С, при підвищенні рівнів сироваткових трансаміназ більш як у 5 разів – припинити лікування.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ехінацея пурпура	Спеціальних рекомендацій немає	Контроль при порушенні функції сечовивідних органів.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Женьшень	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Залеплон	Не рекомендується при тяжкій недостатності ч/з небезпек у розвитку енцефалопатії.	З обережністю при недостатності тяжкого ступеня.	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при хр. легеневої недостатності.
Заліза гідроксид	спеціальних застережень немає	спеціальних застережень немає	спеціальних застережень немає	спеціальних застережень немає
Заліза глюконат	застосовувати з обережністю	застосовувати з обережністю	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає
Заліза препарати	З обережністю при гепатиті, панкреатиті, недостатності.	З обережністю при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Заліза сахарат	спеціальних застережень немає	спеціальних застережень немає	спеціальних застережень немає	спеціальних застережень немає
Заліза сульфат	застосовувати з обережністю	застосовувати з обережністю	спеціальних рекомендацій немає	спеціальних рекомендацій немає
Заліза ф умарат	дотримуватись особливої обережності	спеціальних застережень немає	спеціальних застережень немає	спеціальних застережень немає
Занамівір	Немає необхідності зміни дози	Немає необхідності зміни дози	Спеціальних рекомендацій немає	Перед застосуванням лікарського засобу пацієнтам з тяжкою БА необхідно ретельно оцінити співвідношення користь/ризик, препарат не повинен призначатися без ретельного медичного нагляду та наявності відповідного обладнання, що може бути необхідним для лікування бронхообструкції.

Зидовудин	Корекція дози при цирозі.	Корекція дози при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Зипразидон	З обережністю при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при подовженнях інтервалу Q-T, г. ІМ, декомпенсованій СН, аритміях, що лікуються антиаритмічними ЛЗ ІА та ІІІ класів. З обережністю при брадикардії, порушенні електролітного балансу, прийомі препаратів, що подовжують інтервал Q-T.	Спеціальних рекомендацій немає
Золмітрип тан	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при тяжкій АГ, ІХС, ангіоспастичній стенокардії.	Спеціальних рекомендацій немає
Золпідем	Протипоказаний при тяжкій гострій або хр. недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при тяжкій ДН; с-мі апное під час сну.
Зопіклон	Протипоказаний при тяжкій недостатності, корекція дози при цирозі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при г. ДН, тяжкому с-мі затримки дихання під час сну.
Зофеноприл	Тяжкий ступінь порушення функції печінки - протипоказаний	Протипоказаний при білатеральному ренальному у артеріальному стенозі чи однобічному у разі наявності однієї нирки	Лікування не повинно розпочинатись у хворих на г. ІМ, якщо існує ризик додаткової серйозної гемодинамічної недостатності внаслідок лікування вазодилататором	Спеціальних рекомендацій немає
Зуклопентик сол	Призначати половину від звичайної дози, а також, при можливості, визначати рівень препарату у сироватці крові.	Корекція дози не потрібна.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ібупрофен	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжких порушеннях функцій.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при БА.
Івабрадин	З обережністю при помірній недостатності.	З обережністю при кліренсі креатиніну <15 мл/хв.	Протипоказаний при брадикардії, кардіогенному шоці, СССВ, блокадах, наявності штучного водія ритму, г. ІМ, нестабільній стенокардії, вираженій гіпотензії, СН ІІІ-ІV класів.	Спеціальних рекомендацій немає
Ідарубіцин	Оцінка функції перед початком лікування при метастазах у печінці, супутньому підвищенні рівня білірубину та печінкових ферментів у 4 рази	Спеціальних рекомендацій немає	Частий ЕКГ-контроль. З обережністю при хворобах серця.	Спеціальних рекомендацій немає
Ізодибут	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ізоконазол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Ізоніазид	Протипоказаний при гепатиті, цирозі.	Протипоказаний при недостатності.	З обережністю при тяжкій легенево-серцевій недостатності, вираженому атеросклерозі, ІХС, АГ.	Протипоказаний при БА.
Ізосорбід у динітрат	з особливою обережністю та під наглядом лікаря	з особливою обережністю та під наглядом лікаря	з особливою обережністю та під наглядом лікаря	спеціальних рекомендацій немає
Ізосорбід у мононітрат	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	з обережністю, з врахуванням протипоказань.	спеціальних рекомендацій немає.
Ізотретиноїн	Протипоказаний при недостатності. Контроль функції.	Протипоказаний при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ізофлуран	Протипоказаний при печінковій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	При ІХС при проведенні анестезії – підтримка нормальних значень параметрів гемодинаміки.	Спеціальних рекомендацій немає
Ілопрост	Зменшити дозу при цирозі.	Зменшити дозу при недостатності, вимагає діалізу.	З обережністю при артеріальній гіпотензії. Моніторинг при тяжких захворюваннях серця.	Спеціальних рекомендацій немає
Іматиніб	Використовувати з обережністю.	З обережністю при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Іміпрамін	Протипоказаний при тяжкій печінковій недостатності	Протипоказаний при тяжкій нирковій недостатності	Протипоказаний при нещодавно перенесеному ІМ, порушенню провідності, аритмії серця.	Спеціальних рекомендацій немає
Імудон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Імуноглобулін антитирозинний	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Імуноглобулін антидифтерійний людини	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Імуноглобулін антитимоцитарний	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Імуноглобулін антицитомегаловірусний	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Імуноглобулін людини антитрезус Rho (D)	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Імуноглобулін людини нормальний	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає		
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	Спеціальних рекомендацій немає	У випадку ниркової недостатності застосування припинити	призначати з обережністю	Спеціальних рекомендацій немає
Імуноглобулін людини проти вірусу Епштейна-Барр	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Імуноглобулін людини проти вірусу простого герпесу	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Імуноглобулін протиправцевий людини	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Імунофлазид	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.

Індапамід	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при недостатності.	Контроль калію плазми при захворюваннях вінцевих артерій, СН.	Спеціальних рекомендацій немає
Індінавір	спеціальних рекомендацій немає.	У випадку появи ознак і симптомів нефролітазу, включаючи біль у поперековій ділянці у поєднанні з гематурією (мікрогематурією) чи без неї, необхідне тимчасове припинення терапії (1 - 3 дні). Усім хворим, які приймають препарат, рекомендується адекватна гідратація.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Індометацин	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності	З обережністю при хр. СН, АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Інозин	Показаний при гепатиті, жировій дистрофії та цирозі.	Спеціальних рекомендацій немає	Не рекомендується у г. період ІМ.	Спеціальних рекомендацій немає
Інозин пранобекс	Контроль параметрів функції (трансамінази, креатинін).	Протипоказаний при сечокам'яній хворобі, тяжкій нирковій недостатності III ступеня. З обережністю при гіперурикемії, уролітазі, зниженні функції. Контроль рівня сечової кислоти у сироватці; параметрів функції.	Протипоказаний при порушеннях серцевого ритму.	Спеціальних рекомендацій немає
Інсулін аспарт	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Інсулін глюлізин	Фармакокінетичні властивості інсуліну глюлізину не досліджувались у пацієнтів з порушенням функції печінки	При порушенні функції нирок потреба в інсуліні може знижуватись, однак здатність інсуліну глюлізину швидко діяти зберігається	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Інсулін детемер	Ретельний моніторинг глікемії і підбирати дозу інсуліну детемеру індивідуально	Ретельний моніторинг глікемії і підбирати дозу інсуліну детемеру індивідуально	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Інсулін ліспро	У випадку печінкової недостатності потреба в інсуліні може зменшитись	У випадку ниркової недостатності потреба в інсуліні може зменшитись	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Інсулін людини	Печінкова недостатність може зменшити потребу хворого в інсуліні	Ниркова недостатність може зменшити потребу хворого в інсуліні	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Інсулін свинячий	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Інсулін у препараті	Зменшення дози.	Зменшення дози. Затримка виділення при недостатності	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Інтерлейкін-2 рекомбінантний людини	Протипоказаний при декомпенсованій печінковій недостатності	Протипоказаний при гострій нирковій недостатності ІІБ - ІІІА, аваскулярній пухлині або доброякісній пухлині нирки, кистозній формі або термінальній стадії нирково-клітинного раку.	Протипоказаний при серцевій недостатності III ступеня	Протипоказаний при дихальній недостатності
Інтерферон альфа	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Інтерферон альфа-2b	Показаний, якщо немає недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	З обережністю при тяжких хворобах серця, ССЗ.	Спеціальних рекомендацій немає
Інтерферон альфа-2a	протипоказаний.	протипоказаний.	протипоказаний.	спеціальних рекомендацій немає.
Інтерферон бета-1b	Протипоказаний при захворюваннях у фазі декомпенсації. Контроль функції.	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при СН III - IV ФК, кардіоміопатії. При їх розвитку на фоні лікування – відміна препарату.	Спеціальних рекомендацій немає
Інтерферон бета-1a	З обережністю, моніторинг при тяжкій недостатності.	З обережністю, моніторинг при тяжкій недостатності.	Контроль при ІХС, застійній СН, аритмії.	Спеціальних рекомендацій немає
Інтерферон бета-1a			Контроль при ІХС, застійній СН, аритмії.	
Інтерферон лейкоцитарний людський	Протипоказаний	Протипоказаний	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Інфламафертин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Інфліксимаб	Слід належним чином оцінювати та спостерігати за хронічними носіями вірусу гепатиту В перед початком та протягом лікування препаратом	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю слід застосовувати для лікування пацієнтів із СН легкого ступеня, протипоказаний пацієнтам із СН тяжкої та середньої тяжкості	Лікування не повинно проводитись, якщо діагностується активний туберкульоз; у випадку латентного туберкульозу перед початком терапії препаратом необхідно провести специфічне протитуберкульозне лікування
Інфліксимаб	З обережністю при дисфункції. Якщо рівень білірубін, рівень АЛТ підвищиться в ≥ 5 разів - відміна препарату.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при СН III-IV ФК.	Протипоказаний при активному туберкульозі. Перед початком лікування - шкірний туберкуліновий тест і рентгенографія грудної клітки.
Іпідакрин	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при обструкції сечовивідних шляхів.	Протипоказаний при стенокардії, вираженій брадикардії, обережно при захворюваннях ССС.	Протипоказаний при БА
Іпратропію бромід	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при порушеннях сечовиділення внаслідок доброякісної гіперплазії передміхурової залози.	Пацієнтів з тяжкою серцевою хворобою (ішемічна хвороба серця, аритмія або тяжка серцева недостатність) необхідно попередити, щоб вони звернулися по медичну допомогу при відчутті болю в грудній клітці або при інших симптомах погіршення роботи серця.	Спеціальних рекомендацій немає
Ірбесартан	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю.	З обережністю при СН, аортальному і мітральному стенозі, обструктивній гіпертрофічній кардіоміопатії.	Спеціальних рекомендацій немає

Іринотекан	У пацієнтів з гіпербілірубінемією кліренс Іринотекану знижується і, відповідно, зростає ризик гепатотоксичності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
ІРС 19®	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Іпоприду гідрохлорид	з обережністю.	з обережністю.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Ітракон азол	Корекція дози при цирозі печінки.	Корекція дози при недостатності.	Не рекомендується при з астійній СН.	Спеціальних рекомендацій немає
Іф осф амід	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при недостатності функції або обструкції сечовивідних шляхів.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Йогексол	З обережністю при тяжких порушеннях функції.	З особливою обережністю при порушеннях функції.	З обережністю при тяжких ССЗ.	З обережністю при легеневій гіпертензії, БА, реакціях на контрастні препарати.
Йод	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при нирковій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Йопромід	Спеціальних рекомендацій немає	Можлива нефротоксичність після введення.	З обережністю при хворобах серця тяжкого ступеня, пороках серця, легеневій гіпертензії.	Спеціальних рекомендацій немає
Йопромід	Спеціальних рекомендацій немає	У пацієнтів з нирковою недостатністю кінцевої стадії неіонні контрастні речовини можна виводити шляхом діалізу	У пацієнтів з коронарною хворобою серця тяжкого ступеня існує підвищений ризик появи клінічно значущих гемодинамічних змін та аритмії; у пацієнтів з пороком серця і легеневою гіпертензією може призводити до виражених гемодинамічних змін	Ризик розвитку реакцій гіперчутливості є вищим за наявності БА
Йохімбе	Протипоказаний при тяжкій недостатності, контроль за функцією.	Протипоказаний при тяжких захворюваннях, контроль за функцією.	Протипоказаний при лікуванні адреноміметиками, гіпертонічному кризі. З обережністю при захворюваннях з високим ризиком тахікардії, раптового зниження АТ, схильністю до судом, при станах, що супроводжуються затримкою сечовипускання, тяжкій АГ.	Спеціальних рекомендацій немає

Йохімбе	Необхідно бути обережними при порушеннях функції	Необхідно бути обережними при порушеннях функції	Протипоказаний при лікуванні адреноміметиками, гіпертонічному кризі. З обережністю при захворюваннях, з високим ризиком тахікардії, раптового зниження АТ, схильністю до судом, при станах, що супроводжуються затримкою сечовипускання, тяжкій АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Каберголін	Протипоказаний при недостатності, з обережністю при захворюваннях.	З обережністю при недостатності.	З обережністю при ССЗ.	Не рекомендовано застосовувати препарат у пацієнтів, які мають клінічні симптоми або ознаки на даний момент (або випадки їх в анамнезі) респіраторних захворювань, пов'язані з фіброзом тканин.
Кагоцел	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Калію йодид	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при недостатності, протипоказаний при нефриті, нефрозі.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при туберкульозі легень.
Калію оротат	Протипоказаний при цирозі з асцитом.	Протипоказаний при гострій та вираженій ХНН.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Калію перманганат	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Калію хлорид	Спеціальних рекомендацій немає	При хронічних захворюваннях нирок можливий розвиток гіперкаліємії; призначати у зменшених дозах	Протипоказаний при АВ блокаді. З обережністю пацієнтам з порушенням АВ провідності. При застосуванні у високих дозах (4 - 6 г/добу) контроль за концентрацією калію в крові	Спеціальних рекомендацій немає
Кальцитонін	Корегувати дозу не потрібно.	Корегування дози не потрібно.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кальцитріол	Протипоказаний.	Протипоказаний при нефролітазі, тяжких захворюваннях нирок.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кальцію гліцерофосфат	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при тяжкій недостатності	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кальцію глюконат	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кальцію добезилат	Протипоказаний при захворюваннях печінки.	Протипоказаний при захворюваннях нирок. При тяжкій нирковій недостатності, яка вимагає проведення діалізу, слід зменшити дозу препарату.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Кальцію добезилат	Протипоказаний при захворюваннях печінки.	Протипоказаний при захворюваннях нирок. При тяжкій нирковій недостатності, яка вимагає проведення діалізу, слід зменшити дозу препарат у.		
Кальцію карбонат	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при ГНН, сечокам'яній хворобі.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при бронхогенному раку легень
Кальцію лактат	Спеціальних рекомендацій немає	При важкій нирковій недостатності - протипоказаний	При вираженому атеросклерозі - протипоказаний	Спеціальних рекомендацій немає
Кальцію фолінат	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кальцію хлорид	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при вираженому атеросклерозі.	Спеціальних рекомендацій немає
Камфора	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Канаміцин	Протипоказаний.	Протипоказаний, ретельний контроль функції.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кандесартан	Корекція дози при легкій, помірній недостатності.	Корекція дози при недостатності, пацієнтам на гемодіалізі.	Корекція та титрування доз и.	Спеціальних рекомендацій немає
Капецитабін	Нагляд при легких, помірних порушеннях функції, спричинених метастазами в печінку.	З обережністю при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Капреоміцин	Спеціальних рекомендацій немає	Корекція режиму дозування в залежності від кліренсу креатиніну.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Каптоприл	Не рекомендується при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при стенозі ниркових артерій з прогресуючою азотемією. Пацієнти з порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну ≤ 40 мл/хв) потребують корегування дозування відповідно до кліренсу креатиніну.	Протипоказаний при стенозі устя аорти, обструктивних явищ на шляху відтоку крові від серця.	Спеціальних рекомендацій немає
Карбамазепін	Проводити оцінку функції печінки на вищому рівні та періодичні оцінки цієї функції протягом терапії, особливо у пацієнтів із захворюваннями печінки в анамнезі.	Рекомендується проводити оцінку функції нирок та визначення рівня азоту сечовини крові на початку та періодично протягом курсу терапії.	Протипоказаний при атріовентрикулярній блокаді	Спеціальних рекомендацій немає.
Карбетозин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Застосовується з обережністю при наявності в анамнезі мігрені, СС захворювань	Застосовується з обережністю при наявності в анамнезі БА
Карбомер	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Карбоплатин	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний якщо швидкість клубочкової фільтрації < 30 мл/хв	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Карбоцистеїн	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при загостренні гломерулонефриту.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Карведилол	Підбір дози при недостатності, помірній дисфункції.	Моніторинг функції при титруванні дози. При значному погіршенні функції – зменшити дозу, припинити прийом.	З обережністю при СН при низькому тиску, ІХС, генералізованому атеросклерозі.	З обережністю при ХОЗЛ.
Кармустин	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при значному зменшенні ФЖОЛ.
Каспофунгін	Для хворих з помірною недостатністю рекомендована доза 35 мг/день; коли необхідно, початкова навантажувальна доза в день 1 повинна становити 70 мг; клінічного досвіду застосування для лікування хворих з тяжкою недостатністю немає.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кверцетин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кветіапін	Призначати з обережністю.	Підбір дози.	З обережністю при СС та цереброваскулярних захворюваннях і станах, які можуть призвести до гіпотензії.	Спеціальних рекомендацій немає
Квінаприл	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при нирковій недостатності. У пацієнтів із кліренсом креатиніну менше 30 мл/хв. рекомендована початкова доза 2,5 мг.	З обережністю при застійній СН	Спеціальних рекомендацій немає
Кетамін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при тяжкій АГ, хворим, у яких підвищення АТ може погіршити стан (застійна СН, тяжкі СС розлади)	Спеціальних рекомендацій немає
Кетоконазол	Протипоказаний. При місцевому застосуванні - спеціальних рекомендацій немає.	Протипоказаний. При місцевому застосуванні - спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кетопрофен	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	З обережністю при АГ та ССЗ, для яких характерна затримка рідини. Контроль АТ обов'язковий.	Протипоказаний при БА, риніті в анамнезі після застосування НПЗ.
Кеторолак	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при середній або тяжкій недостатності.	З обережністю при СН, АГ.	Протипоказаний при БА.
Кетотифен	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Не відмінити протиастматичні засоби.

Кислота аденозинтрифосфатна	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Обережно застосовувати при вираженій брадикардії, синдромі слабкості синусового вузла, AV-блокаді I ст.; протипоказано при гострому ІМ, артеріальній гіпотензії, AV-блокаді II-III ст., геморагічному інсульті	Обережно застосовувати при БА, при запальних захворюваннях легень протипоказаний
Кислота азелайнова	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота алендронова	Спеціальних рекомендацій немає	Не рекомендують пацієнтам з кліренсом креатиніну менше 35 мл/хв.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота амінокапронова	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при захворюваннях з порушенням їх функції.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота аскорбінова	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при гіпероксалатурії, сечокам'яній хворобі та ін.; добова доза не має перевищувати 1 г.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота ацетилсаліцилова	З обережністю.	З обережністю.	Спеціальних рекомендацій немає	Можливий бронхоспазм або напад БА при алергічних ускладненнях
Кислота борна	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота вальпроєва	Можливе ізольоване і тимчасове підвищення рівня ферментів печінки, без клінічних симптомів.	Зменшити дозу при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота гамма-аміномасляна	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказання - ГНН.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота глутамінова	Протипоказаний при недостатності	Протипоказаний при недостатності, нефротичному с-мі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота глутамінова	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при недостатності, нефротичному с-мі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота гопантенова	Спеціальних рекомендацій немає	При гострій нирковій недостатності протипоказаний	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота золедронова	Корекція дози не потрібна.	Не рекомендується при кліренсі креатиніну < 30 мл/хв.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота ібандронова	Корекція не потрібна.	З обережністю при кліренсі креатиніну ≤30 мл/хв.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота клодронова	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота кромогліциєва	З обережністю при недостатності.	При нирковій недостатності рекомендується проводити моніторинг функціональних показників, при необхідності доза може бути знижена.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Кислота меф енамінова	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю призначати.	З обережністю при гострій недостатності.	З обережністю при БА.
Кислота меф енамінова	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при захворюваннях нирок	З обережністю призначають хворим при наявності г. серцево-судинної недостатності	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота мікоф енолова	Спеціальних рекомендацій немає	Зменшення дози при тяжкій ХНН.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота налідик сова	Протипоказаний при недостатності. З обережністю при захворюваннях.	Протипоказаний при недостатності. Зменшення дози при кліренсі креатіну 20 мл/хв.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота ніко тинова	Необхідно контролювати функцію печінки.	Спеціальних рекомендацій немає	Тяжкі форми АГ, атеросклероз (для в/в введення) - протипоказано; з обережністю застосовувати хворим з нестабільною стенокардією та г.ІМ.	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота памідронова	Корекція дози не потрібна	Не застосовувати для лікування хворих з тяжкими порушеннями функцій нирок, за винятком випадків, загрозливих для життя	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота пипемідинова	Не рекомендується призначати при тяжкій недостатності печінки	Не рекомендується призначати при тяжкій недостатності нирок	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Кислота саліцилова	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Кислота тіоктова	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота транексамова	Спеціальних рекомендацій немає	У випадках порушення видільної функції нирок необхідна корекція режиму дозування; протипоказаний при нирковій недостатності	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота ур содеоокси холева	протипоказаний при виражених порушеннях функції.	протипоказаний при виражених порушеннях функції.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Кислота ф олієва	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кислота ф узидова	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кладрибін	Ретельно оцінити співвідношення ризик/користь	Ретельно оцінити співвідношення ризик/користь	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кларитроміцин	Слід дотримуватися обережності при застосуванні препарату.	Необхідна корекція дози.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Клемастин	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при гіпертрофії передміхурової залози, обструктивних явищах у шийці сечового міхура.	Спеціальних рекомендацій немає	Не застосовувати при захворюваннях НДШ, БА.

Кліндаміцин	Слід з обережністю призначати. Безпека та ефективність препарату у формі вагінальних супозиторіїв не досліджувалися у пацієнтів з порушенням функцій печінки.	Слід з обережністю призначати. Безпека та ефективність препарату у формі вагінальних супозиторіїв не досліджувалися у пацієнтів з порушенням функцій нирок.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Клобетазол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Клозапін	Активні захворювання печінки, з нудотою, анорексією, жовт ужою; прогресуючі захворювання, печінкова недостатність - протипоказаний	Тяжкі захворювання нирок - протипоказаний	Тяжкі захворювання серця (міокардит) - протипоказаний	Спеціальних рекомендацій немає
Кломіпрамін	Періодично контролювати активність печінкових ферментів.	При затримці сечі з обережністю	У хворих на ортостатичну гіпотензію або з лабільністю судинної системи може відмічатися різке зниження АТ	Спеціальних рекомендацій немає
Кломіфен	Протипоказаний	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Клоназепам	З обережністю призначати препарат хворим із порушенням функції; протипоказаний при тяжкій недостатності	З обережністю призначати препарат хворим із порушенням функції; протипоказаний при тяжкій недостатності	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при тяжких станах дихальної недостатності, незалежно від причини; обережно застосовувати препарат при лікуванні пацієнтів з хронічними захворюваннями дихальної системи
Клонідин	З обережністю.	З обережністю.	З обережністю при ССЗ.	Спеціальних рекомендацій немає
Клопідогрель	Протипоказаний при тяжкій недостатності, контроль лабораторних показників функції.	Призначати з обережністю.	У хворих з г. ІМ з підйомом сегменту ST лікування не слід починати протягом перших декількох днів після інфаркту, через відсутність даних, не рекомендується застосування клопідогрелю при г. ішемічному інсульті (менш 7 днів).	Спеціальних рекомендацій немає
Клотримазол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Клофазимін	Застосовувати з обережністю,	Застосовувати з обережністю,	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Колістим	Спеціальних рекомендацій немає	дотримуватися обережності при застосуванні препарату у хворих з порушенням функції; рекомендується давати оцінку функції нирок на початку лікування і контролювати її в ході лікування; необхідно контролювати концентрації колістиметату натрію в сироватці	Спеціальних рекомендацій немає	інгаляція а/б як процедура може спричинити рефлекторний бронхоспазм
Корглікон	Спеціальних рекомендацій немає	Зменшити дозу при порушеннях видільної функції.	Протипоказаний при с-мі гіперчутливості каротидного синуса, АВ блокадах, СССВ без водія ритму, гіпертрофічній кардіоміопатії, ізольованому митральному стенозі, г. ІМ, нестабільній стенокардії, с-мі WPW, СН з порушенням діастолічної функції, екстрасистоїї.	Спеціальних рекомендацій немає
Корінь солодки	Протипоказаний при порушенні функції	Протипоказаний при порушенні функції	Протипоказаний при АГ.	Спеціальних рекомендацій немає
Кортексин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Кофеїн-бензоат натрію	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при вираженому підвищенні АТ, атеросклерозі, органічних захворюваннях ССС, у т. ч. гострому ІМ, пароксизмальній тахікардії, АГ	Спеціальних рекомендацій немає
Ксантинолуїтінат	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при СН ІІБ-ІІІ ст., г. ІМ, декомпенсованій СН, стенозі лівого мітрального клапана.	Спеціальних рекомендацій немає
Ксенон	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ксилометазолін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при сильних реакціях на адренергічні препарати, тяжких ССЗ: ІХС, АГ. Протипоказаний при гострих коронарних захворюваннях, серцевій астмі.	Спеціальних рекомендацій немає
Лабеталол	З обережністю призначають пацієнтам із захворюваннями печінки, з огляду на ризик гепатоклітинних уражень, що мають оборотний характер.	Пацієнтам з ураженням нирок потрібно зменшувати дозування.	У пацієнтів з наявністю периферичних циркуляторних розладів застосовують з обережністю в зв'язку з можливістю переміжної кульгавості.	Спеціальних рекомендацій немає.
Лактобактерин	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Лактулоза	Збільшення дози при (пре)комі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Ламівудин	З обережністю при гепатиті В. При ВІЛ, гепатиті В - визначати показники функції і маркери реплікації вірусу гепатит у В.	Зменшення дози при помірній і тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ламотриджин	Початкову дозу, збільшення дози та підтримуючу дозу повинні необхідно зменшити загалом на – 50 % у пацієнтів з помірною (шкала Чайльд-П'ю, ступінь В) та на 75 % – з тяжкою (шкала Чайльд-П'ю, ступінь С) печінковою недостатністю	Початкова доза базується на індивідуальній схемі протиепілептичного лікування, при лікуванні хворих зі значною нирковою недостатністю слід зменшувати підтримуючу дозу.		
Ланреотид	При недостатності необхідно моніторувати функцію печінки з метою адаптації, якщо необхідно, частоти введення препарату	При недостатності необхідно моніторувати функцію нирок з метою адаптації, якщо необхідно, частоти введення препарату	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Лансопрозол	Корекція дози при недостатності.	Корекція дози.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Лапатиніб	З обережністю застосовується у хворих з помірною або тяжкою недостатністю.	Підстав для зменшення доз його при лікуванні хворих з нирковою недостатністю немає	Лікування хворих, у яких існують порушення функції лівого шлуночка, слід під наглядом лікаря.	Спеціальних рекомендацій немає
Латанопрост	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Поки не накопичено достатнього клінічного досвіду, призначати препарат пацієнтам з БА слід з обережністю.
Лацидипін	З обережністю при недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при зменшеному серцевому резерві, нестабільній стенокардії, недавно перенесеному ІМ	Спеціальних рекомендацій немає
Левамізол	З обережністю	З обережністю	З обережністю	Спеціальних рекомендацій немає
Леветірацетам	При тяжких порушеннях функції печінки - проти показаний; пацієнтам з печінковою недостатністю легкого й середнього ступенів тяжкості корекція режиму дозування не потрібна	При нирковій недостатності дозу варто коригувати залежно від рівня кліренсу креатиніну	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Леводропропизин	Обережно при наявності патології функції печінки.	Обережно при наявності патології функції нирок.	Спеціальних рекомендацій немає.	Протипоказано при наявності мокротиння, недостатності мукоциліарного кліренса (циліарна дискінезія, синдром Картагенера).

Левомепромазин	Протипоказаний при тяжкій недостатності	Протипоказаний при тяжкій недостатності	Протипоказаний при тяжкій кардіоміопатії (циркуляторна недостатність)	Спеціальних рекомендацій немає
Левоноргестрел	Не рекомендується при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Левотироксин натрію	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при ІХС, СН, та аритмії.	Спеціальних рекомендацій немає
Левофлоксацин	Корекція дози не потрібна.	Потрібна корекція дози для хворих із порушеною функцією нирок (нирковою недостатністю) .	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Лейпрорелін	Клінічні дослідження за участю пацієнтів з печінковою недостатністю не проводилися.	Клінічні дослідження за участю пацієнтів з нирковою недостатністю не проводилися.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ленограс тим	Ефективність і безпека застосування препарат у хворих з порушенням функції не встановлені	Ефективність і безпека застосування препарат у хворих з порушенням функції не встановлені	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Леркандипін	З обережністю при недостатності, протипоказаний - при тяжкій недостатності.	З обережністю при недостатності, протипоказаний - при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при вираженому мітральному і аортальному стенозі, гіпертрофічній кардіоміопатії, декомпенсованій застійній СН, нестабільній стенокардії, 1 місяць після ІМ.	Спеціальних рекомендацій немає
Летрозол	Для пацієнок з ураженням печінки корекція дози не потрібна; у пацієнтів з тяжкою недостатністю час напіввиведення летрозолу приблизно в два рази довший, ніж у здорової людини; такі хворі потребують більш уважного спостереження	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Лефлуномід	Не рекомендується при тяжкій недостатності, контроль – АЛТ, загальний аналіз крові.	З обережністю при недостатності.	Контроль АТ.	Спеціальних рекомендацій немає
Лецитин	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.	спеціальних рекомендацій немає.
Ліастен	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.	Спеціальних рекомендацій немає.
Лідокаїн	З обережністю.	З обережністю.	З обережністю при зниженому АТ, СН, аритмії, брадикардії, порушенні провідності.	Спеціальних рекомендацій немає
Лізін	Протипоказаний при тяжких порушеннях функції	Протипоказаний при тяжких порушеннях функції	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає

Лізиноприл	Спеціальних рекомендацій немає	Зменшення дози при важкій нирково-судинній гіпертензії. У разі ниркової недостатності (кліренс креатиніну <80 мл/хв) початкову дозу необхідно підбирати відповідно до показників кліренсу креатиніну пацієнта.	Зменшення дози при СН	Спеціальних рекомендацій немає
Лінезолід	Корекція дози не потрібна.	Корекція дози не потрібна.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Лінестренол	Протипоказаний при холестатичній жовтусі, гепатиті, раку печінки у жінок.	Спеціальних рекомендацій немає	Прийом препарату слід припинити у випадку тромбозу.	Спеціальних рекомендацій немає
Лінкоміцин	З обережністю при тяжкій недостатності.	Зменшення дози при тяжкій недостатності, контроль функції нирок.	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю призначати пацієнтам з БА в анамнезі.
Ліпін	Спеціальних рекомендацій немає	Препарат застосовується у складі комплексної терапії	Препарат застосовується у складі комплексної терапії	Препарат застосовується у складі комплексної терапії
Літій	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при порушенні видільної функції.	Протипоказаний при ХСН, порушенні серцевого ритму та провідності.	Спеціальних рекомендацій немає
Ловастатин	З обережністю при захворюваннях, контроль рівня трансаміназ.	З обережністю при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Лодоксамід	Не досліджувався для цієї категорії пацієнтів; однак, зважаючи на низьку системну абсорбцію лодоксаміду після місцевого застосування, в коригуванні дози немає необхідності	Не досліджувався для цієї категорії пацієнтів; однак, зважаючи на низьку системну абсорбцію лодоксаміду після місцевого застосування, в коригуванні дози немає необхідності	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Лозартан	протипоказаний.	початкову корекцію дози проводити не потрібно.	початкова доза становить 12,5 мг 1 раз на добу, з особливою обережністю призначають препарат пацієнтам зі стенозом аортального і мітрального клапанів або обструктивною гіпертрофічною кардіоміопатією.	спеціальних рекомендацій немає.
Ломефлоксацин	Немає необхідності регулювати дозу для хворих на цироз печінки з нормальною функцією нирок.	Хворим з вираженим порушенням функції нирок треба коригувати режим дозування залежно від кліренсу креатиніну.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Ломустин	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при фіброзі легень.
Лоперамід	Призначати з обережністю.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Лоратадин	Зменшення дози при тяжкій недостатності.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Лорноксикам	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при помірній або тяжкій недостатності, контроль функції.	Протипоказаний при СН, з обережністю при АГ.	Протипоказаний при БА.

Лютропін альфа	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Магнію сульфат	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при артеріальній гіпотензії, вираженій брадикардії, AV-блокаді.	Протипоказаний при захворюваннях органів дихання, які супроводжуються ДН.
Макрогол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при ХСН.	Спеціальних рекомендацій немає
Максимум	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Манітол	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при ГНН та ХНН.	Протипоказаний при некомпенсованій СН.	Протипоказаний при набряку легень.
Мапротилін	Контроль показників функції.	Контроль показників функції. З обережністю при гіпертрофії передміхурової залози.	З обережністю при ІМ, аритмії, ІХС. Контроль ЕКГ, АТ.	Спеціальних рекомендацій немає
Мегідролін	З обережністю. Обережно при тяжкій печінковій недостатності.	З обережністю. Обережно при тяжкій нирковій недостатності.	Не рекомендується при порушенні серцевого ритму.	Спеціальних рекомендацій немає
Мегідролін	З обережністю призначають при тяжкій недостатності (можлива корекція дози та інтервалів між прийомами)	З обережністю призначають при тяжкій недостатності (можлива корекція дози та інтервалів між прийомами); протипоказаний при гіпертрофії передміхурової залози	Не рекомендується при порушенні серцевого ритму	Спеціальних рекомендацій немає
Мебеверин	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Мобендазол	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Мемікар	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Меміфон	Протипоказаний при тяжких порушеннях функції	Протипоказаний при порушеннях функції	Протипоказаний при інсульті, ІМ в анамнезі (не раніше ніж за 6 місяців до початку терапії), декомпенсованій СН	Спеціальних застережень немає
Мегестрол	Протипоказаний.	Спеціальних рекомендацій немає	Протипоказаний при тяжких порушеннях серцевої діяльності.	Спеціальних рекомендацій немає
Медазепам	Призначати з обережністю.	Спеціальних рекомендацій немає	З обережністю при недостатності кровообігу.	З обережністю при ДН.
Медроксипрогестерон	Протипоказаний при важких захворюваннях печінки з порушеннями її функції	Призначати з обережністю хворим з порушеннями функцій нирок, перебіг яких може погіршуватися внаслідок затримки рідини	Призначати з обережністю хворим з порушеннями функцій серця, перебіг яких може погіршуватися внаслідок затримки рідини	Призначати з обережністю хворим на астму, перебіг якої може погіршуватися внаслідок затримки рідини
Мексидол	Протипоказаний при гострій недостатності	Протипоказаний при гострій недостатності	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Мексикор	Протипоказаний при недостатності	Протипоказаний при недостатності	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Мексилетин	З обережністю при захворюваннях	З обережністю при захворюваннях	З обережністю при брадикардії, артеріальній гіпотензії, СН.	Спеціальних рекомендацій немає

Мелоксикам	Протипоказаний при тяжкій недостатності.	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при аортокоронарному шунтуванні, тяжкій неконтрольованій СН.	Протипоказаний при БА, назальних поліпах, що пов'язані із ацетилсаліциловою кислотою або іншими НПЗП.
Мелфалан	Призначати з обережністю.	Зменшення дози.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Мемантин	З порушенням функції печінки легкого або середнього ступеня тяжкості (Child Pugh A, B) корекція дози не потрібна. З тяжким порушенням функції печінки не рекомендується.	Зменшення дози при недостатності середньої важкості.	Контроль при ІМ, декомпенсованій застійній СН III - IV ФК.	Спеціальних рекомендацій немає
Менадін	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Менопаузальний гонадо тропін людини	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Мепівакаїн	Застосовувати з обережністю	Застосовувати з обережністю	Перевірка стану СС системи.	Спеціальних рекомендацій немає
Меркаптоп урин	Зменшення дози.	Зменшення дози.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Меропенем	Для пацієнтів з печінковою недостатністю коригування дози не потрібне. Ретельно стежити за рівнями трансаміназ та білірубіну.	Зменшення дози при кліренсі креатиніну < 51 мл/хв. З обережністю при одночасному призначенні з потенційно токсичними для нирок препаратами.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Месалазин	Протипоказаний при тяжкій недостатності. Контроль АЛТ або АСТ.	Протипоказаний при тяжких порушеннях функції.	Спеціальних рекомендацій немає	Контроль при БА.
Месна	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Местеролон	Протипоказаний при пухлинах.	Протипоказаний при раку передміхурової залози.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Метадон	З обережністю при тяжкій недостатності.	З обережністю при тяжкій недостатності, гіпертрофії простати, стриктурі уретри.	З особливою обережністю при пролонгації інтервалу QT, контроль при порушеннях серцевої провідності.	Протипоказаний при ДН. З обережністю при БА, ХОЗЛ або "легеневому серці", с-мі апное уві сні.
Метамізол натрію	Протипоказаний при тяжких порушеннях	З обережністю	З обережністю при АТ нижче 100 мм рт. ст. та нестабільній гемодинаміці.	Протипоказаний при БА.
Метандісон	Протипоказаний при недостатності.	Протипоказаний при раку або аденомі передміхурової залози, гострому або хр. простатиті.	Протипоказаний при ІХС, ІМ, СН.	Спеціальних рекомендацій немає
Метилдопа	Не використовувати при активному гепатиті або недостатності, цирозі.	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає
Метиленовий Синій	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає	Спеціальних рекомендацій немає